

№	მოსაწოდებელი საქონელი	მახასიათებლები და რაოდენობები
1	მცენარეული დნმ-ის საექსტრაქციო ნაკრები (Plant DNA purification Kit)	წიმუშების რაოდენობა: არანაკლებ 300 წიმუშების ტიპი: ქსოვილოვანი დანიშნულება: სუფთა დნმ-ის გამოყოფა სოკოდან, მცენარის ფოთლიდან, ქლოროპლასტიდან დნმ-ის დაკავშირების მოცულობა: არანაკლებ 0.9 მგ გამოყოფის ტექნოლოგია: Silica Spin Column დნმ-ის საბოლოო ელუცია: არანაკლებ 80%. დნმ-ის ზომა: მოიცავდეს 30 კპ ვარგისიანობა: მოწოდებიდან არანაკლებ 6 თვე მომწოდებელმა თან დაურთოს: დნმ-ის საექსტრაქციოდ საჭირო ყველა ხსნარი: ბუფერი (Resuspension Buffer, გამრეცხი ბუფერები, დამლექი ბუფერი, ელუციის ბუფერი, დამაკავშირებელი ბუფერი, რნმ-აზა) დნმ-ის საექსტრაქციოდ საჭირო ყველა სინჯარა: (შემგროვებელი და გამრეცხი სინჯარები შესაბამისი რაოდენობით) დნმ-ის საექსტრაქციო ნაკრების პროტოკოლი არ საჭიროებდეს ცენტრიფუგირებას: არაუმეტეს 15 000 X g
2	სადეზინფექციო ხსნარი (DNA Away)	ფუნქცია: სამუშაო ზედაპირების (მინა, მეტალი, პლასტიკა), ბუნიკების და ქიმიური ჭურჭლის დნმ-გან და დნმ-ასაგან გაუსწებოვნება, არატოქსიური, მყისიერი მოქმედებით რაოდენობა: არანაკლებ 1.5 ლ
3	სადეზინფექციო ხსნარი (RNA Away)	ფუნქცია: სამუშაო ზედაპირების (მინა, მეტალი, პლასტიკა), ბუნიკების და ქიმიური ჭურჭლის რნმ-გან და დნმ-ასაგან გაუსწებოვნება, არატოქსიური, მყისიერი მოქმედებით რაოდენობა: არანაკლებ 1 ლ ვარგისიანობა: უვადო
4	აბსოლიტური სპირტი (Ethyl alcohol, Pure)	ფუნქცია: მოლეკულური სამუშაოებისათვის სისუფთავის ხარისხი: არანაკლებ 96% რაოდენობა: არანაკლებ 2 ლ საქონლის საერთო ვარგისიანობის არანაკლებ 70% მოწოდების მომენტისათვის
5	ბაქტერიული შტამი	<i>Pseudomonas avellanae</i> (საკოლექციო ნომ.: 11809, Type strain/ ISPAVE B.062, PD 2378. ასევე: სხვა საკოლექციო ნომრები: NCPPB 3487. BPIC 631, ICPB 9746) გამოყოფილია მცენარე თხილიდან (<i>Corylus avellana</i>). ლიოფილიზირებული და დნმ-ს სახით. (1 ცალი)
6	ნუტრიენტ აგარი	საკულტივაციო ნიადაგი ბაქტერიებისათვის, ფხვნილის სახით, 500 გრ. უნდა შეიცავდეს : პეპტონს 5.0 გრ, ხორცის ექსტრაქტს 3.0 გრ, აგარს, 15.0 გრ. თავსებადი უნდა იყოს მიკრობიოლოგიური სამუშაოებისთვის, ბაქტერიული კულტურის გასათესად.
7	ფსეუდომონას გამოსაყოფი აგარი	ფხვნილის სახით, 500 გრ. სელექტიურ- დიფერენციალური საკვები არე <i>Pseudomonas</i>. spp-სთვის. უნდა შეიცავდეს: აგარს 13.6 გრ/ლ; მაგნიუმის ქლორიდს 1.4 გ/ლ; გადამუშავებული ცხოველური ქსოვილი (peptic digest of animal tissue) 20გრ/ლ ; კალიუმის სულფატი 10გრ/ლ; ტრიკლოსანი (ირგასანი) 0.025გრ/ლ . საბოლოო pH უნდა იყოს 7 +0.2 თავსებადი უნდა იყოს მიკრობიოლოგიური სამუშაოებისთვის, ბაქტერიული კულტურის გასათესად.