

ანტირაბიული ვაქცინაციის პერიოდში და მისი დამთავრებიდან 2 თვის განმავლობაში, აკრძალულია ყველა სხვა-მათ შორის პროფილაქტიკური აცრების ჩატარება (გარდა ანტიტეტანური აცრისა), რომელიც ტარდება ცოფის საწინააღმდეგო აცრასთან ერთად. ანტირაბიული და ანტიტეტანური აცრების ჩატარების შემდეგ შესაძლოა პოსტვაქცინალური გართულებები. რომელთაგან ყველაზე უფრო საყურადღებოა შრატისმიერი დაავადება, მისი კლინიკა როგორც წესი, ვითარდება აცრიდან მე-7-14 დღეს. აღნიშნული გართულება ხასიათდება ტემპერატურის აწევით, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილით, ლიმფადენოპათიით, ურტიკარული ხასიათის გამონაყარით. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია ექიმთან განმეორებითი კონსულტაცია.

ჰიპოალერგიული დიეტა

ალერგიული რეაქციებისა და შრატისმიერი დაავადების განვითარების რისკების შესამცირებლად საჭიროა ჰიპოალერგიული დიეტის მკაცრი დაცვა **10-14** დღის განმავლობაში. იმ პროდუქტების აკრძალვით, რომლებიც ხშირად იწვევენ ალერგიულ რეაქციებს: რძე და რძის პროდუქტები (ახალი რძე, მაწონი), შოკოლადი და კაკაოს ნაწარმი, ციტრუსები (ფორთოხალი, ლიმონი, მანდარინი, გრეიფრუტი და ა.შ), ქათმის კვერცხი, სოიო, არაქისი, თხილი, კაკალი, თევზი და ზღვის პროდუქტები, ღორისა და ცხვრის ხორცი, ძეხვეული, მმარი, მაიონეზი, ცხარე სანელებლები (მდოგვი, აჯიკა, ტყემალი და ა.შ), პომიდორი, პირშუშა, თაღგამი, ბოლოკი, ბადრიჯანი, სოკო, მარწყვი, ნესვი, ყურძენი, ანანასი, საფუარიანი ცომის ნაწარმი, თაფლი, გაზიანი სასმელები, ყავა.

ლიტერატურა: ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული კოლექცია „ივერიელი“ dspace.nplg.gov.ge, თ. გოგიძე - „ცოფი, მისი პრევენცია და ნაკბენი ჭრილობების ქირურგიული მკურნალობა“, თბილისი, 2010; Баранов А.А. и другие - «Пищевая аллергия», М. 2013; Soares - Weiser k et al - "The diagnoses of food allergy". Allergy 2014.

თსუ გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა



ანტირაბიული

(ცოფის საწინააღმდეგო)

ვაქცინაციის ბარათი

ANTIRABIC VACCINATION CARD

დაზარალებული Injured: _____

აგრების კალენდარი: Vaccination Schedule

დღე Days	დანიშნულია თარიღი Fixed Vaccination Date	შესრულებულია თარიღი Established Vaccination Date
0		
3		
7		
14		
28 (30)		
90		

სამახსოვრო - რეკომენდაცია

ნაკბენი ჭრილობა ტრავმულ დაზიანებებს განეკუთვნება. ცოფით დაავადებული ცხოველის ნერწყვში არსებულმა ვირუსმა შესაძლოა გამოიწვიოს ადამიანის დაინფიცირება და სასიცვდილო დაავადების ცოფის (ჰიდროფობიის) განვითარება.

სლოფი (Rabies, Lissa, Hydrophobia) ტეტანუსთან ერთად მწვავე ქირურგიული სპეციფიკური ინფექციაა, რომელიც ჭრილობითაა განპირობებული, მიმდინარეობს ცენტრალური ნერვული სისტემის მიმე, შეუქცევადი დაზიანებით და როგორც წესი მთავრდება ლეტალური გამოსავალით - თუ ადამიანი დროულად არ მიმართავს ანტირაბიულ სამსახურს, რომელიც მუშაობს 24 საათის განმავლობაში.

ექიმთან დროული მიმართვა ცოფის თავიდან აცილების ერთადერთი საშუალებაა. საერთაშორისო რეკომენდაციებით მიღებული ნაკბენი ჭრილობის ქირურგიულ დამუშავებასთან და ანტირაბიულ (ცოფის საწინააღმდეგო) აგრებთან ერთად, ისე როგორც სხვა ტრავმების დროს უნდა ჩატარდეს ტეტანუსის (გაშეშების) პროფილაქტიკა.

იხილეთ რეკომენდაციები (ასაკობის) ჩატარებისას დასული უნდა იყოს შემდეგი წესები:

- ექიმის მიერ დანიშნულ დროს გამოცხადდით აგრებ;
- დაუშვებელია უზმოზე ვაქცინაცია და აგრების თვითნებურად შეწყვეტა;
- დაიცავით ექიმის რეკომენდაციები: კანის ჰიგიენის დაცვა, მზის აბაზანების აკრძალვა, მოერიდეთ ფიზიკურ დატვირთვასა და სტრესულ სიტუაციას;
- ცხოველთან ყოველგვარი კონტაქტის შეფასება და შემდგომი გადაწყვეტილების მიღება ექიმ რაზიოლოგის პრეროგატივაა, რადგანაც ფარული პერიოდის უკანასკნელი 10 დღის განმავლობაში, ცოფის ვირუსი უკვე ნერწყვშია და დადორბელის შემთხვევაშიც კი ცხოველი უკვე დაავადებულია. ცოფის ინკუბაციური (ფარული) პერიოდი მერყეობს 8-10 დღიდან 1 წლამდე (საშუალოდ 30-90 დღე). ამდენად, აუცილებელია ექიმთან განმეორებითი ვიზიტები მოწოდებული სქემის მიხედვით.
- ნაკბენი ჭრილობის შეფასება და მკურნალობა კომპლექსურია, ტარდება ქირურგ-რაზიოლოგთან, საყოველთაოდ მიღებული ტაქტიკით, საჭიროების შემთხვევაში კი სხვა სპეციალისტ ექიმებთან ერთად.
- აგრების ჩატარების დროს და მათი დამთავრების შემდგომ პერიოდში ალკოჰოლის მიღების აკრძალვის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ექიმ-რაზიოლოგის მიერ, ვაქცინაციის დანიშნული კურსის გათვალისწინებით. ალკოჰოლი ასუსტებს იმუნიტეტს და შეიძლება თვითონ გახდეს ანტირაბიული ვაქცინის რეაქტოგენობის მიზეზი;

ზემოთ აღნიშნული რეკომენდაციების შეუსრულებლობა იწვევს იმუნიტეტის დაქვეითებას და ამ ფონზე ფატალურ გამოსავალს.