

მისაწოდებელი მცენარეების ნიმუშები

N	დასახელება	არანაკლებ CLT	გარემოწერილობა არანაკლებ CIRC სმ	სიმაღლე არანაკლებ (მ)	ნიმუში
1	აღმოსავლური ჭადარი („Platanus orientalis“) - სიმაღლე არანაკლებ 4.0 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.80 მ სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული. ფესვის ყელიდან 1მ სიმაღლეზე გარშემოწერილობა არანაკლებ 0.2 მ	CLT – 110	20	4.0	
2	ამბრის ხე („Liquidambar styraciflua“) - სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის. ღეროს გარშემოწერილობა (circ) არანაკლებ 0.2 მ. ფესვის ყელიდან 1 მ. სიმაღლეზე. ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ. ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.5 მ. სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც ყველა მხრიდან უნდა იყოს სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 90	20	3.5	

3	უნგრული ცაცხვი („<i>Tilia tomentosa</i> „brabant“) - სიმაღლე არანაკლებ 3.5მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (circ) არანაკლებ 0.2 მ. ფესვის ყელიდან 1 მ. სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ; ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.8 მ. სიმაღლეზე; ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც ყველა მხრიდან უნდა იყოს სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 90	20	3.5	
4	ნეკერჩხალი (ლეკა) კულტივარი 'Crimson King' („<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King“) - შტამბის სიმაღლე არანაკლებ 1.80 მ., ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც ყველა მხრიდან უნდა იყოს სიმეტრიულად განვითარებული. ფესვის ყელიდან 1მ სიმაღლეზე გარშემოწერილობა არანაკლებ 0.2 მ	CLT - 110	20	3	
5	მინდვრის ნეკერჩხალი („<i>Acer campestre</i>“) - სიმაღლე არანაკლებ 3.5 მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის. ღეროს გარშემოწერილობა (circ) არანაკლებ 0.2 მ ფესვის ყელიდან 1მ სიმაღლეზე. ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0.7 მ. ვარჯის განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1.80 მ სიმაღლეზე. ვარჯს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 6 თანაბრად განვითარებული ტოტი, რომლებიც ყველა მხრიდან უნდა იყოს სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 90	20	4	

6	ბურთის ფორმის იაპონური კვიდო („Ligustrum texanum japonicum - (ball)“) - ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT - 70	X	1	
7	ბურთის ფორმის მარადმწვანე ძაბველი („Viburnum tinus (ball)“) - ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული.	CLT-70	X	1.5	